



AP-HP. Centre
Université
Paris Cité

DMU BioPhyGen – Site Cochin
Bâtiment Jean Dausset – 1^{er} étage
27, rue du Faubourg St-Jacques
75679 Paris Cedex 14

Service de Pharmacologie Pr. Jean-Marc TRELUYER
Secrétariat : 01 58 41 32 85 – Fax : 01 58 41 32 85
Labo DECT : 01 58 41 34 81
Réf. Commande : AINPV6
Date d'application : 20/07/2023

Etiquette patient :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Médecin prescripteur :

Dr
Email :
t :

Etiquette service

Attention : renseignements absolument nécessaires pour une interprétation des résultats

Nom du préleveur : Qualité :

☐ Sang ☐ Autres ...

Date et heure du prélèvement : Le/...../..... àh..... Date et heure de dernière administration : Le/...../..... àh..... Date et heure de début de traitement : Le/...../..... àh.....

Posologie mg, toutes les h

Voie d'administration :

Durée de perfusion :

Poids :kg
Taille : cm
Créatininémie : µmol/L
Age gestationnel à la naissance : SA

Epuration extrarénale continue : ☐ non ☐ oui
Dialysé : ☐ non ☐ oui Dernière dialyse (date et heure)
Prochaine dialyse (date et heure)
Cotraitements :

Motif de la demande :

Localisation de l'infection :

Bactérie :
☐ identifié, CMI ...
☐ suspecté
☐ probabiliste

Merci de remplir une feuille de demande par molécule

ANTIBIOTIQUES

☐ Amoxicilline	☐ Amoxicilline/Acide clavulanique	☐ Azithromycine	☐ Aztreonam
☐ Cefazoline	☐ Cefepime	☐ Cefiderocol	☐ Cefixime
☐ Cefotaxime	☐ Ceftaroline	☐ Ceftazidime	☐ Ceftazidime/Avibactam
☐ Ceftobiprole	☐ Ceftolozane/Tazobactam	☐ Ciprofloxacine	☐ Clarithromycine
☐ Clindamycine	☐ Cloxacilline	☐ Colistine	☐ Dalbavancine
☐ Daptomycine	☐ Doxycycline	☐ Imipeneme	☐ Imipeneme/Relebactam
☐ Levofloxacine	☐ Linezolid	☐ Meropeneme	☐ Meropeneme/Vaborbactam
☐ Moxifloxacine	☐ Ofloxacine	☐ Piperacilline	☐ Piperacilline/Tazobactam
☐ Rifampicine	☐ Sulfamethoxazole/Trimethoprim	☐ Tedizolide	☐ Temocilline
☐ Ticarcilline	☐ Tigecycline		

ANTIVIRAUX

☐ Aciclovir	☐ Ganciclovir	☐ Letermovir
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

- dosage en résiduelle : prélever juste avant la prise
- dosage au pic : 10 à 15 min après la fin de perfusion si IV, T2 à 3h si voie orale
- si dialyse : dosage en **prédialyse et postdialyse**
Prélèvement sur tube hépariné **SANS GEL SEPARATEUR** (bouchon vert foncé)